

Tájékoztató a gyermekek sürgősségi ellátásáról

Az utóbbi időben kórházunk gyermekosztálya nagyszámú, kórházi ellátást nem igénylő, járó beteg - gyermekellátásra kényszerül munkanapokon és munkaszüneti napokon egyaránt.

A gyermeklakosság ellátása Sopronban, Fertőszentmiklóson, Fertőrákoson, Sopronkőhidán, Kópházán és Harkán gyermekorvosi körzetben, a többi településen egyes háziorvosi körzetekben biztosított.

Munkanapokon a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét, a rendelési időn kívüli rendelkezésre állást - az őt választó biztosítottak számára ellátást nyújt. Ezen idő alatt az orvos mindig elérhető. Az elérhetőség mikéntjéről a betegeket tájékoztatni kötelező.

A hivatalos munkaidőn kívül orvosi ügyelet működik a sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátására.

Az ügyelet működésének helye és ideje minden rendelésben kifüggesztett, amelynek rendje az alábbi:

Hétköznap; hétfőtől péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig.

Ünnep és munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig.

Településeink közül csak Sopronban működik a soproni gyermeklakosság számára szervezeten gyermekügyelet; ünnep és munkaszüneti napokon reggel 8-tól este 20 óráig a felnőtt háziorvosi ügyelet megerősítéseként.

Vidéki településeink gyermeklakosságának ügyeleti ellátását a vidéki háziorvosi ügyelet biztosítja.

A soproni és a vidéki háziorvosi ügyelet a Kórház területén; Sopron, Győri u. 15. sz. alatt működik, (de nem a gyermekosztályon).

Hívó száma:

+36/99/312-010.

Fertőd és környéke összevont ügyeletként (Fertőd, Fertőszentmiklós, Petőháza, Agyagosszergény, Sarród) működik.

Hívó száma: +36/20/7733-888

Egyik ügyelet sem tekinthető a napi, normál rendelés meghosszabbításának.

A sürgős ellátás másik igen fontos meghatározója a mentés, amely az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a felfalálási helyén a Mentőszolgálat által végzett sürgősségi ellátása, illetve a legközelebbi, megfelelő ellátásra alkalmas egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, illetve a szállítás közbeni ellátása.

Nem véletlen, hogy az ügyeleti ellátás és a mentés körébe tartozó sürgős, életet veszélyeztető állapotok és betegségek körét jogszabály állapítja meg.

Indokolatlan igénybevétel esetén más, valóban sürgős ellátásra szoruló beteg életét teszi kockára az igénybevevő.

Dr. Amberger Erzsébet
kistérségi tisztii főorvos



Mikor forduljunk sürgősséggel gyermekgyógyászati ellátáshoz, ügyelethez?



1. Milyen esetekben forduljanak mentőhöz illetve orvosi ügyelethez?

A csecsemők és kisgyermekek állapota rövid idő alatt változhat, súlyosbodhat, ezért ha gyermekénél az alábbi aggasztó tüneteket tapasztalja, kérjen mielőbb segítséget!

2. A mentőket riassza, és kezdje meg az elsősegélynyújtást! **Mentők: 104.**

- **Ha a gyermek nem vesz levegőt, eszméletlen, pulzusa nem tapintható.**
- **Egyes légzésszavarok esetén:** nehézlégzés, fulladás, leszürkülés, elkékülés, ugató köhögési rohammal kísért nehéz, húzó belégzés, hirtelen bekövetkező rekedtség kínzó légszomjjal, hirtelen kialakuló heves mellkasi fájdalom.
- **Sérülések, balesetek esetén:** láthatóan súlyos sérülés, észlelhető csonttörés, magasból leesés, nagy vérzés, vérvesztés, eszméletvesztéses fejsérülés, égés, forrázás, fagyás, kihűlés, vízbefúlás, mérgezés, idegentest félrenyelése, áramütés, vagy ezek gyanúja, állat súlyos harapása, kígyó marása.
- **Idegrendszeri tünetek esetén:** eszméletlenség, eszméletzavar, eszméletzavarral járó izomrángatózások, feltűnő aluszékonyság, szokatlan heves nyugtalanság, merev tarkó, csillapíthatatlan fejfájás, erős kínzó szédülés, hirtelen látászavar, kettős látás, öngyilkossági kísérlet.

3. Ügyelethez forduljon elsősorban!

Ügyelet helye:

Telefon:

- **Egyes lázas állapotok esetén:** láz 3 hónaposnál fiatalabb csecsemőnél, szabályos lázcsillapítás ellenére sem enyhülő magas láz, láz súlyos, elesett állapottal.
- **Egyes légúti tünetek esetén:** kínzó, nem csillapodó köhögés, nehezített ugató köhögés, sípoló nehézlégzés, légúti betegségben hirtelen rosszabbodás, fájdalomcsillapítás ellenére is fennálló kínzó fül-fájás.
- **Hasi tünetek esetén:** csillapíthatatlan görcsös hasfájás, kínzó has puffadás, szelek elakadása, súlyos, ismétlődő hányás, hasmenés (kiszáradásra utal ha több órája száraz a pelenka), csecsemőnél véres széklet, erős alhasi fájdalom, erős nőgyógyászati vérzés, a here fájdalmas duzzanata esetén.
- **Vizeletürítési zavarok esetén:** vizeletürítés több mint 12 óras hiánya, gyakori fájdalmas vizelés lázzal, véres vizelet nagy hasi fájdalommal.
- **Veszélyes allergiás állapot esetén:** hirtelen bekövetkező, rekedtséggel járó nehezített belégzés, rovarcsípés kifejezett fej/nyak és szemhéj duzzanattal, nagy testfelületre kiterjedő csalánkiütés.
- **Egyes bőrtünetek esetén:** terjedő bőrvérzések, sárgaság, kiterjedt bőrkiütések lázzal.
- **Szociális sürgősség esetén:** ha a gyermeket felügyelet nélkül hagyják, elhanyagolás, bántalmazás jelei vannak.

4. Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás, ha a gyermeknek:

- enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése van, vagy láza csillapítható,
- kevés, nem terjedő kiütése van, általános állapota jó, kullancsot kell kivenni,
- hasmenése, nem ismétlődő hányása, székrekedése van jó állapot mellett,
- receptírás: a szokásos tápszere, állandó gyógyszere elfogyott,
- igazolás közösségbe, táborozáshoz, sportoláshoz.